CASTNIA JORGENSENI (LEP.), NUEVA ESPECIE DE LA REPUBLICA ARGENTINA

por

ALBERTO BREYER

A fines del año 1930 recibí, procedente del Chaco argentino cerca de Resistencia, un ejemplar bastante deteriorado de *Castniidæ,* que en sus caracteres se diferencia mucho de todas las especies descriptas. No quise publicar este hallazgo mientras no tuviera otros ejemplares, pero como corría el tiempo sin poder conseguir lo deseado y no queriendo postergar por más tiempo la publicación de esta interesante especie, la doy a conocer a continuación, dedicándola al incansable y sabio amigo D. Pedro Jörgensen, que tanto ha aportado al conocimiento de nuestra éntomo-fauna.

Castnia Jörgenseni nov.

Cabeza: negra, palpos negros, fuera y abajo blancos.

Tegulas y patagias de color cerviño; el medio del protórax y tórax negro.

Patas: color ceniciento; femures anteriores, adelante y adentro, amarillos; coxas de azul metálico. Una mancha amarilla delante de la raíz del ala.

Alas anteriores: marrón negruzco con un ligero tinte oliváceo. Una ancha faja oblicua pre-apical que toca el margen anterior y no llega al exterior; muestra un ensanchamiento sobre R/5 y M/1. Otra mancha triangular desde la raíz hasta el torno y desde allí cruzando Dc/3 al margen anterior de la célula.

Debajo de M/3 sobresale un diente de color claro hacia afuera. El color de la faja oblicua y de la mancha basal amarillento, oscureciéndose éste en la mancha triangular progresivamente hacia la base. Las nervaduras dentro de la misma son del color oscuro general.

Alas posteriores: Color naranja, pasando a ladrillo.

El margen negro con un tinte algo azulado; dentro del mismo 5 manchas amarillas intranervales. Las nervaduras del color de la faja se estrechan hacia la base.

Dibujo de las alas en la faz inferior algo más pálido; en las alas posteriores las manchas amarillas intranervales son mucho mayores, apareciendo entre ellas y el color general anaranjado, otra fila de manchitas levemente azules, rodeadas de negro.

Abdomen: cerviño oscuro arriba; abajo amarillento, con una angosta faja de color negro azulado.

Exp. alar: 90 mm.

Habitat: Chaco (Resistencia).

Holotipo ♀ en mi colección.



Castnia jörgenseni Breyer